

## Verlag excursie Loonse en Drunense Duinen op 27 januari 2018

Het was al behoorlijk druk op het parkeerterrein bij restaurant De Roestelberg in Kaatsheuvel toen wij er om 10 uur met twee auto's arriveerden; we waren met z'n achten. Het was een rustige, milde maar bewolkte winterdag met aan het eind van de wandeling zowaar nog wat zonneschijn. Een specifiek thema voor deze excursie hadden we niet; we zouden wel zien wat we tegenkwamen.

Vanaf het restaurant ging het meteen omhoog tegen de steile zandheuvel op met daarachter, vanaf de top goed te overzien, een grote zandvlakte met enige groene plekken erin. We wandelden in oostelijke richting op de grens van duinen en bos en al gauw zagen we een Grote bonte specht tegen een berkenstam zitten. Op het hout van een dode stronk ontdekten we enkele paddenstoelen: Gewone zwavelkopjes (*Hypholoma fasciculare*). Het had de voorgaande weken flink geregend en daardoor stooft het zand niet, maar was de bovenlaag vochtig. Er lag een groene waas van algen over, maar er groeide hier en daar ook wat gras en er waren grote plekken met mos. Tussen dit mos ontdekten we enkele kleine oranje-rode schijfjes: het Groot oranje mosschijfje (*Octospora humosa*) en er groeiden opvallend veel kleine donkere paddenstoeltjes, Zandkaalkopjes (*Deconica montana*).



Groot oranje mosschijfje  
(*Octospora humosa*)



Haarmos  
(*Polytrichum spec.*)



Gewone zwavelkopjes  
(*Hypholoma fasciculare*)

Het gras bleek Buntgras te zijn (*Corynephorus canescens*) en het mos was een Haarmos (*Polytrichum spec.*). Op sommige plaatsen groeide tussen dit mos ook korstmos, wat vooral opviel door de lichtgrijze kleur ervan tegenover de donkergroene kleur van het mos. Dit korstmos bestond uit twee soorten: Rood bekermos (*Cladonia coccifera*) met helderrode kelkjes en Heidestaartje (*Cladonia crispata*).



Rood bekermos  
(*Cladonia coccifera*)



Heidestaartje  
(*Cladonia crispata*)

Tussen het Buntgras ontdekten we tijdens een koffiepauze ook een grassoort, Vroege haver (*Aira praecox*).

Onder een Grove den (*Pinus sylvestris*) met er omheen wat berken zagen we op een dode stronk de Teervlekkenzwam (*Ischnoderma benzoinum*) en het Gewoon elfenbankje

(*Trametes versicolor*) en verderop het Fopelfenbankje (*Lenzites betulinus*). Op een dode berkenstam groeide de Berkenzwam (*Piptoporus betulinus*).



Berkenzwam  
(*Piptoporus betulinus*)



Gewoon elfenbankje  
(*Trametes versicolor*)

Het was hier in het open zandlandschap heel rustig; er waren in het zand plekken met veel ronde keutels en urinesporen, waarschijnlijk een baltsplek van Reeën want er waren opvallend veel sporen van het Ree te zien. Genietend van de stilte wandelden we nu richting de bosstrook om zo naar ons beginpunt terug te keren. Het dennenbos had zichtbaar te lijden gehad van de beide januaristormen, want er lagen veel afgewaaide takken en zelfs geheel omgewaaide bomen. Op een oude rottende tak zagen we een mooie, rode Myxomyceet, de Paarse korstzwam (*Chondrostereum purpureum*), de Oranje druppelzwam (*Dacrymyces stillatus*) en ook, op een stronk, de Dennenmoorder (*Heterobasidion annosum*) en het Fluweelpootje (*Flammulina velutipes*).



Paarse korstzwam  
(*Chondrostereum purpureum*)



Dennenmoorder  
(*Heterobasidion annosum*)

In de bomen hoorden en zagen we diverse vogels: Goudhaantje, Pimpelmees, Koolmees en Boomklever.

En zo arriveerden we weer bij onze auto's en was deze rustige excursie ten einde.  
Gerard Verroen.