

Verlag natuurexcursie Meijndel op 22 september 2018

Het was een bewolkte en tamelijk frisse ochtend en daardoor was het nog niet druk in Meijndel, zodat we onze auto's bij het bezoekerscentrum konden parkeren en een gunstig vertrekpunt hadden voor onze wandeling.

We waren met z'n achten en wandelden in een rustig tempo door het gevarieerde duingebied, ondertussen zoekend naar paddenstoelen. En de eerste die we vonden, en dan meteen in een flink aantal, was



de Groene knolamaniet (*Amanita phalloides*) en kort erna de Gewone zwavelkop (*Hypholoma fasciculare*). Van de Parelamaniet (*Amanita rubescens*) vonden we enkele door de droogte misvormde exemplaren.

We wandelden onder Eiken die vol zaten met eikels en later in een dennenaanplant. Een Fluweelboleet (*Xerocomus subtomentosus*) trok onze aandacht. Er stonden veel soorten Russula's waarvan we de volgende soorten op naam konden brengen: Scherpe kamrussula (*Russula amoenolens*), Regenboogrussula (*Russula cyanoxantha*), Geelwitte russula (*Russula ochroleuca*), Braakrussula (*Russula emetica*).



Kardinaalsmuts



Russula

We kwamen terecht in een gebied met hoge duinen begroeid met eiken en op de bodem prachtige mossen. Veel Lelietjes van dalen (*Convallaria majalis*) bevatten trosjes oranje bessen. Hier zagen we Kaneelkleurige melkzwammen (*Lactarius quietus*) staan, de Zwavelmelkzwam (*Lactarius chrysorrheus*), het Eikenbladzwammetje (*Gymnopus dryophilus*) en de Slanke trechterzwam (*Clitocybe gibba*) en op een dode tak de Twijgkorstzwam (*Stereum ochraceoflavum*) én een Gewone hertenzwam (*Pluteus cervinus*). Toen er even een zonnestraal doorkwam vloog er een Bont zandoogje rond. We kruisten het fietspad tussen het bezoekerscentrum en het strand en kwamen nu in het gebied naast de infiltratieplassen van het waterwinbedrijf Dunea. Dit is een smal

slingerend duinpaadje met Duindoorns, Dennen en Meidoorns. Hier zagen we weer andere paddenstoelen: veel Groene knolamanieten (*Amanita phalloides*), Gepeperde melkzwam (*Lactarius piperatus*), Roodbruine slanke amaniet (*Amanita fulva*), Panteramaniet (*Amanita pantherina*), Viltig judasoor (*Auricularia mesenterica*), Parelstuifzwam (*Lycoperdon perlatum*), Eekhoorntjesbrood (*Boletus edulis*) en Berkenzwam (*Piptoporus betulinus*). Tot tweemaal toe vloog er een groep Lepelaars over, zo laag dat we die we goed konden waarnemen.

We zagen weer andere paddenstoelen: Gele knolamaniet (*Amanita citrina*), Gele korstzwam (*Stereum hirsutum*), Gewone krulzoom (*Paxillus involutus*), Biefstukzwam (*Fistulina hepatica*),



Twijgkorstzwam



Zwavelzwam

Platte tonderzwam (*Ganoderma lipsiense*), Gele aardappelbovist (*Scleroderma citrinum*), Grote parasolzwam (*Macrolepiota procera*), Zwavelzwam (*Laetiporus sulphureus*) en de Helmmycena (*Mycena galericulata*). We bewonderden het gedrag van een Hoornaar en zagen langs het pad uitgebloeide Driedistels (*Carlina vulgaris*) staan.

Het ging harder waaien, het werd donkerder en er vielen al wat regenspetters zodat we terugliepen naar de auto's, maar eerst genoten we van een kop koffie in het restaurant. Het was een gevarieerde wandeling, maar door de zeer droge zomer waren er in deze tijd van het jaar nu opvallend weinig paddenstoelen aanwezig.

Gerard Verroen.