

Verslag natuurexcursie Amerongse berg op 20 oktober 2018

Met een beperkt groepje deelnemers - slechts 4 personen hadden zich aangemeld - reden we naar Amerongen, waar we de auto parkeerden bij het bosrestaurant aan de voet van de Amerongse berg. Na de recente droge weken met hoge temperaturen hadden we geen al te hoge verwachtingen wat betreft het aantal soorten paddenstoelen dat we zouden vinden, maar een boswandeling in dit gebied van de Utrechtse Heuvelrug is op zich al prettig. Aan het weer zou het niet liggen want het was prachtig wandelweer, niet koud en weinig wind.



Pantheramaniet

Dus vol goede moed wandelden we het bos in, langzaam omhoog. Links en rechts van het brede bospad stonden oude, hoge Beuken en op de grond lagen hier en daar dikke, dode beukentakken waarop we Porseleinzwammen (*Oudemansiella mucida*) ontdekten; op één zo'n tak ook de Goudvliesbundelzwam (*Pholiota adiposa*). Langs de bosrand, bij wat berken, zagen we Vliegenschwammen (*Amanita muscaria*) staan en op de stam van een dode berk de Berkenzwam (*Piptoporus betulinus*). Ook de Echte tonderzwam (*Fomes fomentarius*) en de Gewone oesterzwam (*Pleurotus ostreatus*) groeide op dode takken, evenals het Gewoon elfenbankje (*Trametes versicolor*) en het Gewoon meniezwammetje (*Nectria cinnabarina*). Op de grens van deze beukenlaan en het erachter liggende dennenbos groeiden zeer veel Echte honingzwammen (*Armillaria mellea*); ook stonden er Russula's met een paarse hoed en Krulzomen (*Paxillus involutus*). Verderop onder de beuken zagen we een mooie Gewone heksenboleet (*Boletus erythropus*) en ook Eekhoortjesbrood (*Boletus edulis*) en hier en daar een Regenboogrussula (*Russula cyanoxantha*) en een Parelamaniet (*Amanita rubescens*). Vooral de Parelamanieten waren nogal misvormd, hoewel ook de andere paddenstoelen meestal geen frisse, verse indruk maakten, maar nog wel goed te herkennen waren. Zo ook de Reuzenzwam (*Meripilus giganteus*) aan de voet van een machtige Beuk met in de buurt Gewone zwavelkoppen (*Hypholoma fasciculare*) en Kastanjeboleet (*Xerocomus badius*).



Parelstuifzwam

We waren nu op de top van de Amerongse berg gekomen en besloten een smal bospad in te slaan, waar in de berm prachtige mossen groeiden. Langs dit pad zagen we enkele mooie exemplaren van de Hanenkam (*Cantharellus cibarius*) en op een stronk Geel hoorntje (*Calocera cornea*) en Spekzwoerdzwam (*Phlebia tremellosa*). Op een dode boom groeide de Dikrandtonderzwam (*Ganoderma adpersum*) en tussen het mos de Amethystzwam (*Laccaria amethystina*).

Na geluncht te hebben op een van de spaarzame bankjes in dit gebied liepen we over een pad met jonge dennenaanplant waar Tweekleurige vaalhoeden (*Hebeloma mesophaeum*) groeiden en bij een stronk de Dennenvoetzwam (*Phaeolus schweinitzii*). Bijna terug bij ons vertrekpunt roken we de geur van de Grote stinkzwam (*Phallus impudicus*) en na enig zoeken tussen de bramenstruiken zagen we een vers exemplaar nog bedekt met de bruine sporenmassa. En zo bereikten we onze auto en keerden we voldaan huiswaarts, want al met al hadden we toch bijna 40 verschillende soorten paddenstoelen gevonden.

Gerard Verroen.